Catharinaea gigantea Horik. Bot. Mag. Tokyo, **50**: 559 (1936) –syn. nov.

Atrichum giganteum (Horik.) Miz. Journ. Jap. Bot. **31**: 119 (1956) –syn. nov.

Atrichum undulatum var. **minus** (Lam. et DC.) Web. et Mohr

Catharinaea chlorochaeta Card. Bull Soc. Bot. Genève, 2 sér. **1**: 130 (1909) –syn. nov.

Atrichum chlorochaetum (Card.) Miz. l. c. –syn. nov.

124) ニワスギゴケ属では次のような整理が必要である。

Pogonatum akitense Besch.

P. kiusiuense Sak. Bot. Mag. Tokyo, **49**: 128 (1935) –syn. nov.

Pogonatum inflexum (Lindb.) Par.

P. rhopalophorum Besch. Ann. Sci. Nat. Bot. **17**: 354 (1893) –syn. nov.

P. eroso-dentatum Sak. l. c. 129. –syn. nov.

P. shiroumanum Sak. (cum var. *major* Sak.) l. c. 132. –syn. nov.

なお，*Pogonatum contortum* var. *elatum* Sak.[7] は基本型と区別する必要のないものである。(続く)

○コモノウラジロノキ（檜山庫三） Kôzô HIYAMA: *Sorbus japonica* Sieb. var. *denudata* Nakai.

コモノウラジロノキ (*Sorbus japonica* Sieb. var. *denudata* Nakai) はウラジロノキの葉裏の白綿毛が薄くなった型で，品種と考えるのが妥当である。これは丁度オガラバナの場合と同じ関係にあると云えよう。コモノウラジロノキは伊勢湾菰野の他に，里見信生氏（北陸の植物 **8**: 96）によれば紀伊・磐城・常陸にも産するとのことであって，ウラジロノキの分布区域内には散見されるものと思われる。1959 年松沢篤郎氏からの送品中に上野の赤城山（1958 年 7 月 6 日採集）産のコモノウラジロノキの標本が 1 枚あった。

Sorbus japonica Sieb. forma **denudata** (Nakai) Hiyama, stat. nov.

Sorbus japonica var. *denudata* Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo no. **33**: 11 (1953)—Nom. Jap. Komono-urajironoki.

---

7) Bot. Mag. Tokyo, **49**: 132 (1935)